

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 72° - Numero 46

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 26 ottobre 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**DECRETI ASSESSORIALI**

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

DECRETO 8 ottobre 2018.

**Aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero - territoriale della Regione siciliana (PTORS).**

B01AD02	Alteplasi	p	Da utilizzare nell'ambito di protocolli terapeutici
B01AD04	Urochinas	p	
B01AD11	Tenecteplase	p	
B01AD12	Proteina C del plasma umano	p	
B01AE	Inibitori diretti della trombina		
B01AE06	Bivalirudina	p	
B01AE07	Dabigatran etexilato	os	
B01AF	Inibitori diretti del fattore Xa		Prevenzione della TEV nei pz adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio con prescrizione limitata ai Centri di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Per le indicazioni: "Prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, qual precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA); età $\geq$ 75 anni; insufficienza cardiaca (Classe NYHA $\geq$ II), diabete mellito; ipertensione" e "Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti". La prescrizione è riservata alle UU.OO. formalmente riconosciute, pubbliche e private accreditate, di cardiologia, medicina interna, neurologia, geriatria, e ematologi di centri di trombosì ed emostasi nonché da parte degli specialisti delle stesse branche convenzionati Interni. La dispensazione deve avvenire in forma diretta da parte dell'ASP di residenza del paziente previa consegna della stampa del PT on line. Limitatamente all'uso nella FANV il PT deve essere corredato dal referto dell'indagine ecocardiografica (da richiedere una sola volta) e, in relazione ai fattori di rischio, una delle seguenti certificazioni: classe NYHA $\geq$ II, diabete, ipertensione, attestazione di avvenuto ictus. Per i pazienti che modificano la terapia da anti-vitamina K a NAO, la documentazione attestante l'instabilità dell'INR rilevata nei sei mesi precedenti al cambio di terapia, deve essere conservata da parte del prescrittore ed esibita su richiesta da parte dell'ASP.
B01AF01	Rivaroxaban	os	
B01AF02	Apixaban	os	
B01AF03	Edoxaban	os	
B01AX	Altri antitrombotici		
B01AX05	Fondaparinux	p	
B02	Antiemorragici		
B02A	Antifibrinolitici		
B02AA	Aminoacidi		
B02AA02	Acido tranexamico	os,p	
B02AB	Inibitori della proteasi		
B02AB02	Alfa 1 antitripsina	p	
B02B	Vitamina K ed altri emostatici		
B02BA	Vitamina K		

B02BA01	Fitomenadione	os, p	
B02B	Vitamina K ed altri emostatici		
B02BB	Fibrinogeno		
B02BB01	fibrinogeno	P	Farmaco non soggetto a compensazione tramite file F
B02BC	Emostatici locali		
B02BC30	Emostatici locali - Tutte le associazioni		Per tutti preparati della classe B02BC30 presenti nel PTORS su richiesta motivata per singolo paziente
B02BD	Fattori della coagulazione del sangue		Prescrizione e somministrazione da parte della <u>Divisione Clinizzata di Ematologia dell'AOU "Poliniclinico V. Emanuele"</u> di Catania e dell'U.O. di Ematologia dell'AOU Poliniclinico "P. Giaccone" di Palermo ai sensi del D.A. 343/18, su PT regionale di cui alla nota prot. n. 947 del 28/11/2017. Un eventuale switch di terapia deve essere motivato e può essere effettuato esclusivamente dai responsabili dei Centri individuati. Al fine di assicurare la continuità terapeutica per i pazienti emofiliaci domiciliati in zone distanti dai predetti Centri, il rinnovo del PT è consentito anche agli specialisti ematologi presso i servizi di immunematologia e medicina trasfusionale delle Aziende Sanitarie. In tali casi, il PT deve essere inviato al Centro di riferimento per la vidimazione secondo quanto specificato nella nota sopra citata
B02BD01	Fattori della coagulazione del sangue	P	Privilegiare i prodotti in conto lavorazione derivati dal plasma siciliano
B02BD02	Fattore VIII di coagulazione del sangue umano liofilizzato	P	Per la formulazione da 1000 U.I. privilegiare i prodotti in conto lavorazione derivati dal plasma siciliano
B02BD02	Morotocog alfa	P	
B02BD02	Octocog alfa	P	
B02BD02	Fattore VIII di coagulazione da DNAR	P	
B02BD02	Simotocog	P	
B02BD02	Turoctocog	P	
B02BD02	Efmotocog alfa	P	
B02BD02	Lonotocog alfa	P	



B03AA	Ferro bivalente, preparati orali				
B03AA03	Ferroso gluconato		os		
B03AA07	Ferroso solfato		os		
B03AB	Ferro trivalente, preparati orali				
B03AB08	Ferritrasferrina		os		
B03AB09	Ferriprotinato		os		
B03AB49	Sodio ferrigluconato		os, p		
B03AB49	Ferromaltoso		os		
B03AC	Ferro - preparazioni parenterali				
B03AC01	Carbossimaltoso ferrico		p		
B03B	Vitamina B12 ed acido folico				
B03BA	Vitamina B12 (cianocobalamina e derivati)				
B03BA01	Cianocobalamina		os, p		
B03BA03	Idrococcobalamina		p		
B03BB	Acido folico e derivati				
B03BB01	Acido folico		os, p		
B03X	Altri preparati antianemici				
B03XA	Altri preparati antianemici				Prescrizione ai sensi del D.A. 540/14 recante "Misure volte a promuovere l'utilizzo dei Farmaci Originari o Biosimilari a minor costo di terapia" limitatamente alle UU.OO. Formalmente riconosciute di Nefrologia e Dialisi, Ematologia, Medicina Interna, Chirurgia, Anestesia e Rianimazione, Oncologia, Pediatria, Gastroenterologia, Servizi di Medicina Trasfusionale e Malattie Infettive Ospedaliere e Universitarie e relativi ambulatori. Centri di Dialisi limitatamente ai pazienti, sia in trattamento dialitico sia in trattamento conservativo seguiti dallo stesso Centro. Strutture di ricovero e cura private accreditate per le stesse branche e specialisti ambulatoriali convenzionati interni per le stesse branche
B03XA01	Epoetina alfa		p		
B03XA01	Epoetina alfa biosimilare		p		
B03XA01	Epoetina beta		p		
B03XA01	Epoetina zeta (alfa biosimilare)		p		
B03XA02	Darbepoetina		p		
B03XA03	Epoetina beta-metossipolietilenglicole		p		
B05	Sucedanei del sangue e soluzioni perfusionali				
B05A	Sangue e prodotti correlati				
B05AA	Sucedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche				

B05AA01	Albumina		P	Nota AIFA 15. Centri prescrittori di cui all'allegato 1 del D.A. 1766/11 e s.m.i. Per la formulazione 50 ml 20% privilegiare i prodotti in contolavorazione derivati dal plasma siciliano. Sospetto di aumento della mortalità rispetto a soluzioni di cristalloidi nelle situazioni critiche associate a ipovolemia.
B05AA02	Proteine plasmatiche umane soluzione		P	
B05AA05	Destrano		P	
B05AA06	Derivati della gelatina (Poligelina)		P	
B05AA07	Etamido		P	Limitatamente al trattamento dell'ipovolemia quando non è indicato l'uso di altri plasma expanders a costo minore
B05B	Soluzioni endovena			
B05BA	Soluzioni nutrizionali parenterali			
B05BA01	Aminoacidi		P	
B05BA02	Emulsioni lipidiche		P	
B05BA03	Destrosio (glucosio) monoidrato		P	
B05BA04	Idrolisati proteici		P	
B05BA10	Tutte le associazioni		P	
B05BB	Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico			
B05BB01	Elettroliti		P	
B05BB02	Elettrolitica associata a carboidrati		P	
B05BC	Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica			
B05BC01	Mannitolo		P	
B05BC49	Glicerolo + sodio cloruro (ATC: B05BC)		P	
B05C	Soluzioni per irrigazioni			
B05CB	Soluzioni saline			
B05CB01	Sodio cloruro		P	
B05CX	Altre soluzioni per irrigazioni			
B05CX03	Glicina		P	
B05CX10	Glicina+Mannitolo		P	
B05CX10	Mannitolo + Sorbitolo		P	
B05D	Soluzioni per dialisi peritoneale			
B05DA	Soluzioni isotoniche		P	
B05X	Soluzioni endovena additive			
B05XA	Soluzioni elettrolitiche			
B05XA	Potassio aspartato		P	
B05XA01	Potassio Cloruro		P	